

## Metode de numărare

### I. Folosirea unor numere importante din combinatorică

#### *Produs cartezian*

Fie  $A_1, \dots, A_n$  mulțimi cu  $m_1, m_2, \dots, m_n$  elemente.


Numărul de elemente al mulțimii  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  este  $m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$ .

#### *Părțile unei mulțimi*

Fie  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ . Numim parte a mulțimii  $A$  orice submulțime a acestei mulțimi. Mulțimea părților lui  $A$  se notează cu  $P(A)$  și are  $2^n$  elemente.

#### *Numărul de funcții*

Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi cu  $n$ , respectiv  $m$  elemente. Prin funcție înțelegem o diagramă de forma



Prin care oricărui element  $x$  din  $A$  i se asociază un unic element  $y$  din  $B$ .

Dacă notăm cu  $f$  această asociere, atunci scriem  $f: A \rightarrow B$ .

Numărul acestor funcții este  $m^n$ .

#### *Permutări*

Fie  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  o mulțime de numere reale. Această mulțime va fi reprezentată în continuare cu ajutorul vectorului  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ . Prin **permuteare** a mulțimii  $A$  vom înțelege, orice vector de dimensiune  $n$  ce conține toate elementele mulțimii  $A$  într-o anumită ordine.

Numărul permutărilor unei mulțimi cu  $n$  elemente este egal cu  $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ . (demonstrația acestui rezultat se face prin inducție matematică).

#### *Combinări*

Fie  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  o mulțime. În continuare vom studia problema generării tuturor submulțimilor cu  $m$  elemente ( $m \in \{1, 2, \dots, n\}$ ) ale mulțimii  $A$ . O astfel de submulțime se numește **m-combinare cu n elemente** a mulțimii  $A$ .

Numărul de m-combinări cu  $n$  elemente este egal cu  $\frac{n!}{m!(n-m)!}$ , notat prin  $C_n^m$  sau  $\binom{n}{m}$ , unde  $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ .

#### *Aranjamente*

Fie  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  o mulțime. Fiind dat  $m \in \{1, 2, \dots, n\}$ , prin **m-aranjament cu n elemente** al mulțimii  $A$  înțelegem orice submulțime ordonată cu  $m$  elemente a lui  $A$  (adică orice vector de dimensiune  $m$  cu elemente distințe din  $A$ ).

Numărul de m-aranjamente cu  $n$  elemente este egal cu  $\frac{n!}{(n-m)!}$ , care se notează cu  $A_n^m$ . Se observă că dintr-o m-combinare cu  $n$  elemente se obțin  $m!$ , m-aranjamente cu  $n$  elemente și deci  $A_n^m = m!C_n^m$ .

## II. Principiul includerii și excluderii

### Enunțul principiului

Fiind date  $n \geq 2$  mulțimi finite  $A_1, A_2, \dots, A_n$  și notând cu  $\text{card}(A)$  numărul de elemente al mulțimii  $A$ , atunci:

$$\text{card}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \text{card}(A_i) - \sum_{i < j} \text{card}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} \text{card}(\bigcap_{i=1}^n A_i)$$

### Demonstrație

Inducție matematică cu pasul 1 după n.

### Aplicație

Se dau  $p_1, p_2, \dots, p_n$  ( $n \leq 10$ ) numere prime distincte mai mici sau egale decât k (k număr natural). Se cere să se determine câte numere naturale mai mici sau egale cu k sunt divizibile cu unul din numerele  $p_1, p_2, \dots, p_n$ .

### Exemplu

Pentru  $n=3$ ,  $p_1=2$ ,  $p_2=3$ ,  $p_3=5$ ,  $k=1000$  se va afișa: 734

(DPA, Baraj lot olimpic de informatică, 2000)

### Indicatie

Considerăm mulțimile:  $A_i = \{p_i q \mid q \in \mathbb{N}, p_i q \leq k\}$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ .

Observăm că numărul căutat este  $r = \text{card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$ , care este egal (conform principiului includerii și

$$\sum_{i=1}^n \text{card}(A_i) - \sum_{i < j} \text{card}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n-1} \text{card}(\bigcap_{i=1}^n A_i)$$

excluderii) cu:

Folosind  $\text{card}(A_i) = \text{card}(\{p_i q \mid q \in \mathbb{N}, p_i q \leq k\}) = [k/p_i]$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $\text{card}(A_i \cap A_j) = \text{card}(\{p_i p_j q \mid q \in \mathbb{N}, p_i p_j q \leq k\}) = [k/(p_i p_j)]$ ,  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ , etc. se obține:

$$r = \sum_{i=1}^n [k/p_i] - \sum_{i < j} [k/(p_i p_j)] + \sum_{i < j < k} [k/(p_i p_j p_k)] + \dots + (-1)^{n-1} [k/(p_1 p_2 \dots p_n)]$$

Pentru a calcula fiecare sumă din r, trebuie să se genereaze termenii sumei, prin metoda backtracking.

## III. Folosirea unor formule pentru sume de numere naturale

1. Suma primelor n numere naturale

$$1+2+\dots+n=n(n+1)/2$$

2. Suma pătratelor primelor n numere naturale

$$1^2+2^2+\dots+n^2=n(n+1)(2n+1)/6$$

3. Suma cuburilor primelor n numere naturale

$$1^3+2^3+\dots+n^3=(n(n+1)/2)^2$$

4. Suma numerelor impare mai mici sau egale cu  $n=2k+1$

$$1+3+\dots+n=k(k+2)$$

5. Suma numerelor pare mai mici sau egale cu  $n=2k$

$$2+4+\dots+n=k(k+1)$$

## IV. Progresii aritmetice si geometrice

Un sir de numere în care fiecare termen, începând cu al doilea, se obține din cel precedent prin adăugarea unei constante (numită rație), se numește *progresie aritmetică*.

### Proprietăți

Dacă a este primul termen, iar r este rația unei progresii aritmetice (formată din termenii  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ), atunci:

- 1)  $x_k = x_{k-1} + r$
- 2)  $x_1 = a$
- 3)  $x_k = (x_{k-1} + x_{k+1})/2$
- 4)  $x_k = a + (k-1)r$
- 5)  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = (x_1 + x_n)n/2 = (2a + (n-1)r)n/2.$

Un sir de numere în care fiecare termen, începând cu al doilea, se obține din cel precedent prin înmulțirea cu o constantă nenulă (numită rație), se numește *progresie geometrică*.

### Proprietăți

Dacă a este primul termen, iar q este rația unei progresii geometrice (formată din termenii  $x_1, x_2, \dots, x_n$ ), atunci:

- 1)  $x_k = x_{k-1} * q$
- 2)  $x_1 = a$
- 3)  $x_k = \sqrt{x_{k-1} * x_{k+1}}$
- 4)  $x_k = a * q^{k-1}$
- 5)  $x_1 + x_2 + \dots + x_n = (q * x_n - x_1) / (q - 1) = (q^{n-1} - 1)a / (q - 1)$ , q diferit de 1.

## V. Metoda backtracking

Prin această metodă se generează toate obiectele cu o anumită proprietate și se numără, fără a reține soluțiile. Numărul rezultat este cel căutat.

## VI. Metoda programării dinamice. Relații de recurență.

Pentru a număra obiectele cu o anumită proprietate, dintr-o problemă se stabilesc diverse formule de recurență, care pot fi găsite mai ușor. Uneori numărul căutat are o formă mai complicată (este o expresie ce poate conține: permutări, combinări, puteri, etc.) și de aceea este mai la indemâna găsirea unor relații de recurență.

## Aplicații

### 1. Problema "NR", PACO

Se consideră n număr natural nenul. Un joc DOMINO conține dominouri în formă de dreptunghi **1×2**. Pe un domino se găsesc inscripționate prin puncte, două numere (pentru fiecare număr k sunt desenate k puncte) ca în exemplul următor:



- conține perechea de numere (1,2)



- conține perechea de numere (0,1)

Jocul DOMINO conține pe dominouri următoarele perechi de numere:

(0,0); (1,1); (2,2); (3,3) ... (n-1,n-1); (n,n)  
(0,1); (1,2); (2,3); (3,4) ... (n-1,n)

(0, 2); (1, 3); (2, 4); ... (n-2, n)

...  
(0, n-1); (1, n)

(0, n)

Cerință

Se cere numărul total de puncte desenate pe dominourile jocului DOMINO.

Date de intrare

Fișierul de intrare **nr.in** conține pe prima linie numărul **n**.

Date de ieșire

Fișierul de ieșire **nr.out** va conține numărul cerut.

Restricții

$1 \leq n \leq 2000000000$

Exemplu

<b>nr.in</b>	<b>nr.out</b>
2	12

**Timp maxim de execuție:** 0.1 secunde/test

2. **Problema "tub"** arhiva .campion
3. **Problema "albine"** arhiva .campion
4. **Problema "teatru1"** arhiva .campion
5. **Problema "scaune"** arhiva .campion
6. **Problema "degrade"** arhiva .campion
7. **Problema "scaune"** arhiva .campion
8. **Problema "cod1"** arhiva .campion
9. **Problema "grad2"** arhiva .campion
10. **Problema "palma"** arhiva .campion
11. **Problema "cd1"** arhiva .campion

## **Bibliografie**

1. Doru Popescu Anastasiu, Combinatorică și Teoria Grafurilor, 2005
2. A.M. Iaglom, I.M. Iaglom, Probleme neelementare tratate elementar. Ed. Tehnică, 1983.
3. P.Radovici Mărculescu, Probleme de teoria elementară a numerelor, Ed. Tehnică, București, 1986
4. Arhiva Educationala .campion